

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎パップ剤

第3類医薬品

ハリマッチ

【特徴】

- ハリマッチは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感パップ剤です。
- ハリマッチは、サリチル酸グリコールやL-メントールなど炎症や痛みなどに効果のある成分を配合していますので、打撲や捻挫などにすぐれた効果を発揮します。
- ハリマッチは、鎮痛・消炎効果のある生薬成分(オウバク軟エキス、サンシシ軟エキス)を配合しています。
- ハリマッチは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

① 目の周囲、粘膜等。 ② 湿疹、かぶれ、傷口。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

(4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 本品膏体100g(875cm²)中

サリチル酸グリコール..... 1.0 g
 L-メントール..... 1.0 g
 トコフェロール酢酸エステル..... 0.3 g
 グリチルリチン酸..... 0.03g
 オウバク軟エキス(原生薬換算量2.31g)..... 0.7 g
 サンシシ軟エキス(原生薬換算量1.0g)..... 0.33g
 添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】 12枚(6枚×2袋)入 <1枚:14cm×10cm>

〈お問い合わせ先〉
 帝國製薬株式会社 お客様相談室
 電話 (0879) 25-2363
 受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931

発売元

松田薬品工業株式会社

愛媛県松山市河野中須賀318

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地



🔄 : シート袋 📄 : 箱

このを押して開けました。