

〈切り取り線〉



チャック ご使用後はチャックをきちんと閉めて保管してください。

開封後はなるべく早くご使用ください。

第3類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

ポインティアG冷感

8枚入

(1枚サイズ: 10×14cm)

鎮痛・消炎冷感パップ剤

ご使用に際して、裏面の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【特 徴】

- ポインティアG冷感は、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- ポインティアG冷感は、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、*d*l-カンフル、*l*-メントール、トコフェロール酢酸エステル)の働きで、打撲、捻挫、筋肉痛などによく効きます。
- ポインティアG冷感は、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

発 売 元： **テイコクファルマケア株式会社**
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元： **帝國製薬株式会社**
香川県東かがわ市三本松567番地

(お問い合わせ先)

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお
願い致します。


帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879)25-2363
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987373 073342

使用上の注意

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】膏体100g中

サリチル酸グリコール 1.0g l-メントール 0.3g

dl-カンフル 0.5g トコフェロール酢酸エステル 0.3g

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エト酸Na、酸化チタン、pH調節剤、その他4成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈包装〉 8枚入(1枚サイズ:10x14cm)



製造者

使用期限
(西暦年月)