

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ホルキスフラスター

外用消炎鎮痛フラスター 第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1～2回患部に貼付する。



4 987373 073991



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、本剤を同じ箇所には、続けて貼らないこと。

【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸メチル 5.0g
 l-メントール 4.0g
 dl-カンフル 1.5g
 トコフェロール酢酸エステル 0.3g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、マクロゴール、BHT、その他2成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開口部を折り曲げ、きちんと閉めて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

〈包装〉32枚入 [8枚×4袋]

〈サイズ〉7×10cm

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

テイコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地