

生薬配合

鎮痛・消炎外用薬

第3類医薬品

【特徴】

- メディカル東京パップ〈クール〉は、生薬(オウバク末及びサンシ末)を配合していますので、打撲・ねんざに伴う熱感、はれ及び痛みなどに効果的です。
- メディカル東京パップ〈クール〉は、粘着性にすぐれた基剤と、伸縮性のある基布を使用していますので、屈伸部位にもピッタリフィットします。

MEパップ

10cm×14cm 5枚入

発売元

メディカル東京株式会社

埼玉県八潮市八潮5-12-5

TEL(0489)95-3061

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

メディカル東京パップ<クール> (MEパップ)

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 本品膏体100g(700cm²)中

サリチル酸メチル……2.0g dl-カンフル………1.0g l-メントール………0.5g

オウバク末………2.0g サンシシ末………1.0g

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エドト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【販売名】メディカル東京パップ<クール>



＜お問い合わせ先＞

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

中
箱
規
格

限
製
用
途
(西)