

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ユノパップホットS

第3類医薬品

特 徴

- 患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステルと温感刺激を付与する植物性生薬(トウガラシ)エキスの働きで、肩こり、腰痛、関節痛などによく効きます。
- 鎮痛効果を発揮するサリチル酸グリコールと抗炎症作用をもつ植物性生薬(オウバク、サンシシ)エキスを配合したパップ剤です。
- 粘着性に優れた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

💬 **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

用法・用量 表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用すること。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

(5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。

(6) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用すること。)

(7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。

(8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

成分・分量 膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸グリコール	2.0g	オウバク軟エキス	0.7g
d/-カンフル	0.5g		(原生薬換算量2.31g)
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	サンシシ軟エキス	0.33g
トウガラシエキス	0.3g		(原生薬換算量1.0g)
			(原生薬換算量3.75g)

添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、カオリン、ポリソルベート80、pH調節剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。
- 衣服に付着すると黄色に着色することがあるので、付着しないように注意すること。

包 装 28枚入[7枚入×4袋](1枚:10cm×14cm)

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

<お問い合わせ先>

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

