

## リペインパップS

10枚入  
(5枚×2)

第3類医薬品

使用に際し、下記説明書きを必ず読むこと。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

- 生薬(オウバク末、サンシシ末)の鎮痛・消炎作用で、打撲・捻挫に伴う熱感・はれ・痛みをやわらげます。
- 心地よい冷感が持続します。
- 粘着性に優れた高含水性基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
次の部位には使用しないこと。

- 1) 目の周囲、粘膜など。2) 湿疹、かぶれ、傷口。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構 電話0120-149-931 (フリーダイヤル)  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

## 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

## 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめしてから使用すること)。

## 成分・分量

本品膏体100g中〔1枚(10cm×14cm)20g〕

サリチル酸メチル	2.0g	オウバク末	2.0g
dl-カンフル	1.0g	サンシシ末	1.0g
l-メントール	0.5g		

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エドト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有する。

ここを  
押し開ける

## 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 未使用分はもとの袋にもどし、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

発売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17  
お客様相談窓口:03-3527-3690

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地