

matsu  
kiyo

Pain-Relief and Anti-Inflammatory Plaster

鎮痛消炎プラスター

イブロックフィルムプラスター

1日1~2回

うすくて目立たないはり薬

温感  
タイプ

# 肩こり 腰痛・筋肉痛に

においが気にならない

7cm×10cm

## 薬のはたらき

肩こり

サリチル酸グリコール:8.0g

・炎症を鎮め、痛みをおさえる

腰痛

メントール:5.0g

・清涼感による刺激と  
軽い知覚麻痺で痛みをおさえる

筋肉痛

トコフェロール酢酸エステル  
(ビタミンE):0.5g

・抹消の血行を促進する

関節痛

ノニル酸ワニリルアミド:0.01g

・温感刺激により血管を拡張し、  
血行が促進され鎮痛を補助する

膏体100g中

第3類医薬品

押してあげてください

## Pain-Relief and Anti-Inflammatory Plaster

Pain-relief and anti-inflammatory plaster (hot type) with four active ingredients (glycol salicylate, L-menthol, tocopherol acetate, and nonanoic acid vanillylamide). Effective for shoulder stiffness, lower back pain, etc.

### こんな方におすすめ

- 肩こり、腰痛などにすぐれた効き目を実感したい方
- うすくて目立たないはり薬をお探しの方

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

#### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象

MADE IN JAPAN

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## イブロックフィルムプラスター 第3類医薬品

### 【用法・用量】

ライナー(はくり紙)をはがし、1日1～2回患部に貼付する。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 打撲(うちみ)、捻挫にははれがひいてから使用すること。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないこと。(強い刺激を感じることもあるので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

### 【成分・分量】 本品1㎡(膏体100g)中

サリチル酸グリコール ..... 8.0g  
 レメントール ..... 5.0g  
 トコフェロール酢酸エステル ..... 0.5g  
 ノニル酸ワニリルアミド ..... 0.01g  
 添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHTを含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。