

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 【用法・用量】

表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

## 【成分・分量】 膏体 100g (1400cm<sup>2</sup>) 中

サリチル酸グリコール……………1.0g l-メントール……………1.0g  
トコフェロール酢酸エステル…0.3g ジフェンヒドラミン塩酸塩……………0.1g  
添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、酸化チタン、pH調節剤、その他4成分を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、開封口をチャックを閉めて保管すること。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

## 【包装】 48枚入 [8枚×6袋] (1枚：14cm×10cm)



〈お問い合わせ先〉  
本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電 話 (0879)25-2363  
受付時間 9:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)



副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

セルフメディケーション

税 控除 対象

発売元

ティコクファルマケア株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

鎮痛・消炎パップ剤

# ポインティアクールG

第3類医薬品

## 【特徴】

- ポインティアクールGは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- ポインティアクールGは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、l-メントール、トコフェロール酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩)の働きで、肩こり、打撲、筋肉痛などによく効きます。
- ポインティアクールGは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。  
(2)湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労