

消炎・鎮痛パップ剤 生薬(オウバク末)配合

第3類医薬品

サンポープラスターA 10[®] 枚入

1枚=17g
(14cm×10cm)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) しっしん、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量

膏体100g中

オウバク末……………5.0g l-メントール……………0.5g
 ジフェンヒドラミン……………0.05g dl-カンフル……………0.3g
 サリチル酸メチル……………0.5g

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、デヒドロ酢酸Na、酸化チタン、カオリン、リン酸水素Ca、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリオキシエチレンセチルエーテル

製造番号

使用期限



4 961248 002781

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特長

サンポープラスターAは有効成分（l-メントール、dl-カンフル、サリチル酸メチル等）の消炎鎮痛効果と同時に基剤中の多量の水が協力的に作用して、患部の浮腫・炎症・疼痛に、より強い湿布効果を発揮します。
さらにサンポープラスターAには、消炎作用のある生薬成分オウバク末が配合されております。

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

1日1～2回患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・定められた用法をお守りください。
- ・小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ・本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ・薬剤面のフィルムをはがし、そのまま患部に貼り、紙テープで止めるか包帯をしてください。
- ・汗をかいているときは、よくふきとってからお貼りください。
- ・患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめ、保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

【お問い合わせ先】

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 三宝製薬株式会社 お客様相談室
 電話 03-3952-0100
 月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日を除く）

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouigai.html>
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

※帯状疱疹 本剤の使用中に痛みをとまなう赤みを帯びた米粒大の水疱があらわれた場合にはウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。



発売元
三宝製薬株式会社
 東京都新宿区下落合2-3-18



製造販売元
東光薬品工業株式会社
 東京都足立区新田2-16-23



粘着シート袋

612N