

手軽に塗れる スティックタイプ

使用法

① 上部のキャップをはずしてください。



② 下部の回転部を右へ回し、薬剤を3~4mm出してください。



③ 適量を患部に塗擦してください。



※揮発性が強いので、ご使用後は必ずキャップをしめて保管してください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



製造番号

使用期限

肩こり 腰痛 打ち身 ねんざ

外用鎮痛・消炎剤

ロクタッチP^{38g}



伸びが良く
手軽に塗れる
スティックタイプ

第3類医薬品

【用法・用量】

通常1日1~数回適量を患部に塗擦してください。キャップをとり回転部を右回転させ薬剤を3~4mm出して使用してください
(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量をお守りください。

【成分・分量】100g中

サリチル酸メチル……………15g
Q-メントール……………5g
dl-カンフル……………5g
ハッカ油……………1g
添加物：ステアリン酸Na、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、イソプロパノール、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
2. 小児の手の届かない所に保管してください
3. 揮発性が強いので、使用後は必ず密栓してください
4. 火気に近づけないでください
5. 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
6. 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2-16-23

お問い合わせ先
TEL 03-3855-0101

ここから
開けてください

第3類医薬品

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ロクタッチPは
スティックタイプの使用に便利な
外用鎮痛・消炎剤です。

！ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】 下記における消炎・鎮痛
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、筋肉痛、関節痛、
筋肉疲労、しもやけ、骨折痛