

sato

第2類医薬品

筋肉・関節の痛みに

サロメチール[®]
ID1%スプレー

インドメタシン1%配合

肩こり
に伴う肩の痛み

腰痛

関節痛

セルフメディケーション

税 控除 対象

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

サロメチールID1%スプレー

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 11才未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■効能 筋肉痛、打撲、捻挫、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

■用法・用量 1日4回を限度として適量を患部に噴霧又は塗布します。●11才未満の小児には使用させないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 顔に向けて噴霧しないでください。(5) 肩、頸部に使用する場合は直接噴霧せず、手に取ってから塗布してください。(6) 大量・広範囲には使用しないでください。(7) 外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(8) 容器をよく振り、真下に向けて噴霧してください。(9) 患部より約5～10cmの距離で噴霧してください。(10) 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないでください。(11) 1週間あたり原液として50g(9日間で本品1本)を超えて使用しないでください。

■成分・分量 130mL中

インドメタシン…607mg(原液1g中 10mg)
L-メントール…1.821mg(原液1g中 30mg)
添加物として、クロタミトン、ベンジルアルコール、1,3-ブチレンジグリコール、イソプロパノール、DMEを含有します。

＜保管及び取扱い上の注意＞

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4) 本剤が衣類や家具、床、皮革製品、化粧品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。(5) 火気に近づけないでください。(6) 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。(7) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

お問い合わせ電話番号 03(5412)7393

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

第一石油類(イソプロピルアルコール)72mL 危険等級Ⅱ 水溶性(火気注意)

発売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

製造番号及び使用期限は底面に記載

副作用救済制度

☎0120-149-931

㊞