

第2類医薬品

# 虫さされ かゆみに ユトラール

かゆみ止め液

●効能・効果●

かゆみ、虫さされ

●成分・分量●100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g  
リドカイン…0.5g  
l-メントール…3.0g  
dl-カンフル…2.0g  
添加物:クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、八アセチルしよ糖、アンモニア

発売元

**ノイジ** 薬品株式会社

大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 072-331-0417

製造販売元

**東光薬品工業株式会社**

東京都足立区新田2丁目16番23号

製造  
番号

使用  
期限



# 虫さされ かゆみに ユトラール

かゆみ止め液

ダブルのかゆみ止め成分で素早く効く!

## ノンステロイド



第2類医薬品

50mL

第2類医薬品

# 虫さされ かゆみに ユトラール

かゆみ止め液

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください。(薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください)

- (1)小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)定められた用法・用量をお守りください。

手を汚さず  
ラクラク  
使える容器!



副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

ここから  
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。