

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛冷感パップ剤

新ラクスキットIDパップ[®]

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲・粘膜等。(2) しつしん・かぶれ・傷口。(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けていた人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感・熱感・乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

成分・分量 膏体100g中

インドメタシン……………0.5g

添加物としてカオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミニウムMg、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントールを含有します。

効能・効果

腰痛・関節痛・腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

○プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。

(2) 定められた用法・用量をお守りください。

(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて外気にふれないように保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

副作用被害救済制度 0120-149-931

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2-16-23

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101



4 987030 195127



B

製造番号

使用期限