

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

## 鎮痛消炎薬 サロメチールIDパップE

第2類医薬品  
(14cm×10cm)

### サロメチールIDパップEの特長

1. **インドメタシン、ビタミンE、グリチルレチン酸配合** ----- 消炎鎮痛効果にすぐれたインドメタシンにビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)、グリチルレチン酸を配合。筋肉痛、腰痛、関節痛にすぐれた効果をあらわします。
2. **強い粘着力と伸縮自在性** ----- ひじやひざにもピッタリフィットします。
3. **微香性** ----- パップ剤特有の香りをおさえています。
4. **保湿ファスナー付** ----- 保湿ファスナーがついていて、パップ剤の乾燥を防ぎます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 連続して2週間以上使用しないでください

#### 🗨️ 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕 腰痛、捻挫、筋肉痛、関節痛、打撲、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)

〔成分・分量と働き〕 膏体100g中(1枚は膏体14g)

成分	分量	働き
インドメタシン	0.5g	抗炎症、鎮痛作用にすぐれ、筋肉痛、関節痛にすぐれた効果をあらわします。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血行をよくし、効果を助けます。
グリチルレチン酸	0.05g	インドメタシンの抗炎症作用を助けます。

添加物として、カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントールを含有します。

〔用法・用量〕 プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。  
・15歳未満の小児は使用しないでください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (2) 定められた用法・用量をお守りください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

#### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元 東光薬品工業株式会社  
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

㊞

押しつけて開けてください。