

腰・肩こりの関節痛みに

RA★KOOL

第3類医薬品

28^(7枚×4袋)枚入

ラクール 消炎・鎮痛温感パップ剤

ラクペタン®

温感

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

ラクペタン温感はサリチル酸メチル、*dl*-カンフルによる消炎鎮痛効果と、トウガラシエキスの配合による温感効果を合わせもち、慢性的な腰痛、肩こり等に優れた効果を発揮します。

販売名 ラクペタン温感

成分・分量

膏体100g中 ※原生薬換算量2.5g
サリチル酸メチル……………1.0g *dl*-カンフル……………0.5g
トウガラシエキス……………0.05g*

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エドト酸Na水和物、パラベンを含有します。

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)汗をかいている時は、よくふきとってからお貼りください。
- (5)患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。
- (6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (7)入浴の30分以上前にははがしてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)しっしん、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

※帯状疱疹

本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

(お問い合わせ先)

ラクール薬品販売株式会社
フリーダイヤル 0120-86-8998



発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号



製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号