

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛温感バップ剤

# ラクスキットID温ハップ

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 本剤による過敏症状 (例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等) を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) しっしん、かぶれ、傷口。
  - (3) みずむし・たむし等または化粧している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください

## 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

成分・分量 膏体100g中

インドメタシン.....0.5g トウガラシエキス.....0.3g (原生薬換算量3.75g)

添加物として、ポリビニルアルコール(部分ケン化)、カルボキシルポリビニルホマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化トマシ油、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エチルセレン、N-メチル-2-ピロリドン、 $\beta$ -メントールを含有します。

### 効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、関節炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 打撲(うちみ)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用してください。
- (6) 本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じる場合があります。
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (8) 本剤を貼った患部をこたつや電気毛布で温めないでください。
- (9) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じる場合がありますので、少なくとも入浴の1時間前に剥がし、入浴後30分ほどしてから使用してください。)

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(製用原因のなったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるかまたは開口部をおりまげて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

発売元

**大木製薬株式会社**

東京都千代田区神田巖田町3-3

製造販売元

**東光薬品工業株式会社**

東京都足立区新田2-16-23

### ＜お問い合わせ先＞

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

東光薬品工業株式会社 03-3855-0101

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

＜電話＞0120-149-931 (フリーダイヤル)



製造番号

使用期限



B