



インドメタシン1%配合パップ剤

# ニューボロンテ1%

経皮吸収型消炎鎮痛冷感パップ剤

第2類医薬品

関節部位にも密着フィット  
剥がれにくいというす型パップ剤

全方向  
伸縮自在  
タイプ



(7枚×2袋入) 1枚 14cm×10cm

# インドメタシン1%配合パップ剤

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

経皮吸収型  
消炎鎮痛冷感パップ剤

# ユーボロンデ1%

第2類医薬品

1枚 14cm×10cm

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
  - 本剤又は本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - ぜんそくを起こしたことがある人。
  - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
  - 目の周囲、粘膜等。
  - 湿疹、かぶれ、傷口。
  - みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください

### 👤 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発売元  

**日邦薬品工業株式会社**  
 東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  

**東光薬品工業株式会社**  
 東京都足立区新田2-16-23

## 特 徴

- インドメタシン配合で、痛みのもとに優れた効果を発揮します。
- うす型でかさばらず、関節部位にもピタッとフィットします。
- 微香性なので、湿布剤独特の気になるニオイを抑えています。

### 成分・分量

膏体100g中(1枚あたり膏体量7g)  
 インドメタシン.....1.0g  
 添加物として、ℓ-メントール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースナトリウム、エデト酸Na水和物、チオ硫酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、酒石酸を含有します。

### 効能・効果

腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

### 用法・用量

- プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
- 15歳未満の小児は使用しないでください。

#### <用法・用量に関連する注意>

- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 定められた用法・用量をお守りください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先  
 日邦薬品工業株式会社 お客様相談室  
 03-3370-7174  
 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)