

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品



⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 1.次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)しつしん、かぶれ、傷口。



相談すること

- 1.次的人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

※帯状疱疹

本剤の使用中に痛みをともなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮ふ科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限



特徴

新ラクールG冷感は有効成分(サリチル酸メチル, *dL*-カンフル, *l*-メントール)による消炎鎮痛効果と製剤中に含まれる多量の水による冷シップ作用により、患部の炎症・疼痛に、優れた効果を発揮します

成分・分量

膏体100g(1000cm)² 中
サリチル酸メチル 0.5g
dL-カンフル 0.5g
l-メントール 0.3g

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、ケイ酸アルミニウムMg、カオリーン、酸化チタン、エドト酸Na水和物、バラベンを含有します。

機能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)汗をかいている時は、よくふきとてからお貼りください。
- (5)患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて外気にふれないように保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】
この商品のお問い合わせは、
東光薬品工業(株) 電話 03-3855-0101
までお願い致します。

【副作用被害救済制度のお問い合わせ】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

TOKO
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号



ここを押してください。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品



△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (やらないと薬の効果が悪化したり、副作用が起らたりする時。)

- 1 次の部位には使用しないでください。
(1)日の周囲、粘膜等。
(2)しつしん、かぶれ、傷口。

☒ 避難すること


- 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体质の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 心 | 発熱・発赤、かゆみ |

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

※ 対応疾患

本剤の使用中に痛みをともなう赤熱を帯びた炎症の大水面があらわれた場合には、ウイルスによる帶状疱疹であることがあります。副作用と見誤えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診断を受けてください。



4 944525 334119

製造番号

使用期限

特徴

新ラクールG冷感は有効成分(サリチル酸メチル、beta-カンフル、beta-メントール)による消炎鎮痛効果と製剤中に含まれる多量の水による冷シップ作用により、腰部の炎症・疼痛に、優れた効果を発揮します。

成分・分量

錠体100mg(1000ml)中

サリチル酸メチル 0.5g
beta-カンフル 0.5g
beta-メントール 0.3g
添加物として、ポリビニルアルコール(部分重合化物)、カルボキシビニルペリマー、ポリアクリル酸鉄分岐和成、CMD-Na、ローリルビードル、グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミニウムNa、カオリン、酸化チタン、エタド酸Na、パラベンを含有します。

效能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉筋炎、しづやけ、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回、腰部に貼付してください。

用法・用量に関する注意

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
(2)小児は使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(4)汗をかいている時は、よく引きとってからお貼りください。
(5)腰部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってお使いください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
(2)直射日光の当たらない涼気の少ない確実な所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えるなでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、脱口部のファスナーをきちんと閉めて外気にあれないように保管してください。
(5)使用期限を過ぎた製剤は使用しないでください。

【添付文書】
この添付文書は、販売元が作成したものです。
東光薬品工業株式会社 03-2855-0101
TEL/FAX: 03-2855-0101
【問い合わせ】
東光薬品工業株式会社
http://www.ohto.co.jp/outline/index.html
TEL: 0120-1499-001 (フリーダイヤル)



開けてください。