

ご使用に際して、この説明文書をお読みください。
また、必要時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

筋肉痛 腰痛 関節痛

経皮吸収型鎮痛消炎剤

新ラクールシップ

28 枚入
7枚×4袋 (11.4mm×5.6mm)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤による過敏症状(例えば発赤・発疹、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - しっしん、かぶれ、傷口。
 - あせりし・たむし等または化粧している部分。
- 連続して2週間以上使用しないでください

⚠ 相対すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------|
| 皮膚 | 発赤・発疹、かゆみ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

(2) 5～8日間使用しても症状がよくならない場合

製造番号
有効期限



4 944525 300015

特 長

- インドメタシン0.15%配合
インドメタシンは痛みを抑える作用(プロスタグランジンなど)の生成を抑え、患部に直接作用し、関節痛、筋肉痛、腰痛などに効果をあらわします。
- ピットリフィット
ひじやひざなどの関節部位にピットリフィットします。
- 安全性
温布用薬時のニオイを抑えています。

成分・分量

膏体100g中 (1枚14g) インドメタシン.....0.5g
添付物：カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化剤)、ポリアクリル酸成分中水和、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エタノール、トメチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミン酸Al、ポリオキシエチレン硬化パラフィン、ホモントール

効能・効果

関節痛、腰痛(手・手指の痛み)、肩の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、引当、捻挫、傷こりに伴う痛みの痛み

用法・用量

- プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
- (用法・用量に留意すること)
- 1回貼は、痛みやむくみの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやむくみの症状のみを治療する薬ですので、症状がある場合だけ使用してください。
 - 汗をかいたり、患部が濡れている時は、よく拭き取ってから使用してください。
 - 厚皮の弱い人は、使用前に患部の角質の除去に時間をとり、1～2cm角の小片を患部として半日以上貼り、発赤・発疹、かゆみ、かぶれ等の症状が起こらないことを確かめてから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になりたり薬質が変わることがあります。)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるかまたは開口部をおりあげて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お読みください】
この製品の説明書はこちら。
東光薬品工業(株) 電話 03-3855-0101
までお問い合わせします。

【お読みください】
この製品は医薬品検査局に合格済み。
http://www.pmda.go.jp/kenkoku/eng.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

※特効薬 本剤の使用中に痛みをとらぬ薬を併用したにもかかわらず痛みがあらわれた場合には、ウイルスによる感染症であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止し、必ず専門医の診察を受けてください。



東光クリエート株式会社
東京都中央区本町1-1-1



東光薬品工業株式会社
東京都中央区本町1-1-1



「1枚貼るだけ」
「痛みを抑える」