

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

インドメタシンが痛みの元に浸透

経皮吸収型鎮痛・消炎剤

インドメタシン
0.5%
配合

新ラッシュェルIDパップ

28枚入
(7枚×4袋)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) っしん、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

特 長

1 インドメタシン配合

インドメタシンは痛みの原因物質(プロスタグランジンなど)の生成を抑え、患部に直接作用し、関節痛、筋肉痛、腰痛などに効果をあらわします。

2 全方向伸縮自在

ひじやひざなどの関節部位にピッタリフィットします。

3 微香性

湿布剤独特のニオイを抑えています。

成分・分量

膏体100g中(1枚14g) インドメタシン……………0.5g
添加物:カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 β -メントール

効能・効果

関節痛、腱鞘炎(手・手の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

○プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

○15歳未満の小児は使用しないでください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。

(2) 定められた用法・用量をお守りください。

(3) 汗をかいたり、患部が濡れている時は、よく拭き取ってから使用してください。

(4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを開けて保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

この商品のお問い合わせは、
東光薬品工業(株)電話 03-3855-0101
までお願い致します。

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

※**帯状疱疹** 本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号



製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号



開
閉
口

この説明文書は、ご使用時に必ずお読みください。
また、必要に応じておめあてよく大切に保管してください。

第2種医薬品

インドメタゾンが痛みのもとを壊す

経皮吸収型鎮痛・消炎剤



新ラッシュェルIDパップ

7枚入

使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らない)と警告の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1、次の人は使用しないでください

- (1) 本剤による過敏症(喘息、発熱、めまい、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2、次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、眼窩部。
- (2) 口、鼻、かぶれ、傷口。
- (3) みずりし、たがし等または化粧している部分。

3、連続して2週間以上使用しないでください

【相談すること】

1、次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の診察を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2、次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 副作用、次の症状があらわれた場合。

副作用	症 状
皮膚	発熱・発赤、かゆみ、はれ、むしり傷、腫れ、乾燥感

(2) コーの副作用服用しても症状がよくならない場合。

特 長

1 インドメタゾン配合

インドメタゾン特効成分の経皮吸収剤【プロステグランジンなど】の生成を阻害、効果的に鎮痛作用し、関節痛、筋肉痛、腰痛などに効果をあらわします。

2 全方向伸縮自在

ひじやひざなどの関節部位にピッタリフィットします。

3 携帯性

コンパクトなデザインを追求しています。

成分・分量

単位100g中 (1枚14g) インドメタゾン 0.5mg
 添加剤: カオリアン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分ケン化)、ポリブタジエン、炭酸カルシウム、カルボキシセルロース、CMC-Na、D-トリスホール、グリセリン、エチルアルコール、トリス(ヒドロキシ)アミノメタン、ポリオキシエチレン硬脂酸エチル、ステアリン酸、ト-メントール

効能・効果

関節痛、腰痛(手・手指の痛み)、肘の痛み(アゴニオリ)、筋肉痛、歯痛、打撲、挫傷、傷こりに伴う痛み

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 本剤は、痛みやほろ苦い等の副作用になっている患者を治療するのではなく、痛みやほろ苦い等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (2) 貼付した箇所、周囲を良好にしてください。
- (3) 汗をかいた、湿気が残っている場合は、よく乾かしてから使用してください。
- (4) 皮膚の個人差は、使用前に患部の皮膚の状態を確認し、1〜2 cm角の貼付を限度として1日以上貼り、発赤・発熱、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確認してから使用してください。

禁忌及び取扱い上の注意

- (1) 患部目的の傷たない腫れやかぶれがひどい時に使用してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の患部に入力が支障ないでください。(患部の状態によって入り方が変わる)
- (4) 品質向上のため、使用部分袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるがまたは開口部をのりまげて保管してください。
- (5) 貼付期間満了まで製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

この商品の問い合わせは、
東光薬品工業(株) 電話 03-5405-0101
までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

この商品の問い合わせは、
(株)東光薬品工業(株) 電話
http://www.dokko.co.jp/contact.html
電話 0120-140-0311(フリーダイヤル)

● 貼付時 本剤の使用時に痛みをとるなら必ず患部を十分に清潔に保ち、患部の乾燥を防ぐために、患部を十分に乾燥させることと、貼付時と剥離時とされることとが重要です。このように患部には使用を中止し、医師や専門店の診察を受けてください。

製造番号

使用期限



4 944525 300121



東光薬品工業株式会社
東京都中央区本町1-3-10 4F



東光薬品工業株式会社
東京都中央区本町1-3-10 4F

