

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 ラクールID1%ゲル

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 肋骨をくそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください



【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

【用法・用量に関する注意】

(1) 11歳以上の中児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満の小児には使用させないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法・用量をお守りください。

MK CUSTOMER

ラクールID1%

ゲル

インドメタシン
1%配合

【成分・分量】100g中
インドメタシン…1,000mg
l-メントール…3,000mg
添加物:ジイソプロバノール
アミン、エデト酸Na水和物、
エタノール、ベンジルアルコール、
カルボキシビニルポリマー、
チオ硫酸Na水和物、
ヒプロメロース、キサンタンガム、
1,3-ブチレングリコール、
ハーゼチルシロ糖、N-メチル-2-ピロリドン

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかねないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質する事がありますので、付着しないよう注意してください。(5) 火気に近づけないでください。(6) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。(7) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

清涼感に優れたゲル剤

痛みに効く!

肩こり 関節痛
の痛み

筋肉痛

腰痛



大容量
80g

第2類医薬品

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101



乳液
保湿
潤滑

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

インドメタシン配合

第2類医薬品

ラクールID1%ゲル

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ラクールID1%ゲルはインドメタシンを生成分とした、局所の痛みを抑える製剤です。

インドメタシンには鎮痛消炎作用があり、腰、関節、肩、筋肉などの痛みをとる働きがあります。ラクールID1%ゲルを痛みのある部分に塗ることにより、インドメタシンが皮膚から吸収され、痛みの原因に直接作用し、効果を発揮します。

特長

- 痛みを和らげるインドメタシンが直接皮膚から吸収されます。
- 運動後や疲労時における腰、関節、筋肉などの局所の痛みをおさえます。
- 塗ったときにのびがよく、清涼感のある製剤です。

△ 使用上の注意

【 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)】

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 滞痰、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿している部位。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 本人または家族がアレルギー体质の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師または薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次のような症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 小	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、挫挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみ使用してください。
- (5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。
- (6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7) 定められた用法・用量をお守りください。
- (8) 使用後は手を洗ってください。

【成分・分量】

100g中

インドメタシン……………1,000mg

0-メントール……………3,000mg

添加物：ジイソプロパノールアミン、エデト酸Na、エタノール、ベンジルアルコール、カルボキシビニルポリマー、チオ硫酸Na、ヒブロメロース、キサンタンガム、1,3-ブチレングリコール、ハーセチルしお糖、N-メチル-2-ピロリドン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質するがありますので、付着しないよう注意してください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- (7) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お問い合わせのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東光製品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3855-0101

受付時間 午前 9:00~午後 5:00 (土・日・祝日を除く)



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区西蒲田1丁目9番14号



製造販売元
東光製品工業株式会社
東京都足立区西蒲田2丁目11番23号