

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛温感パップ剤

新インペタン 温感

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 本剤または本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) しっしん、かぶれ、傷口。
  - (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5〜6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

※帯状疱疹

本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特 徴

- **インドメタシン配合**で痛みのもとに優れた効果を発揮します!!
- **トウガラシエキス配合**で血行を促し温感効果を発揮します!!
- **全方向伸縮タイプ**で関節部位にもピタッとフィットします!!

販売名 新インペタン温感

- **成分・分量**  
膏体100g中  
インドメタシン……………0.5g トウガラシエキス……………0.3g(原生葉換算量3.75g)  
添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、ポリ  
アクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬  
化ヒマシ油、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エデト酸Na水和物、N-メチル  
-2-ピロリドン、β-メントールを含有します。
- **効能・効果**  
筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニ  
ス肘など)、打撲、捻挫

- **用法・用量**  
○プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。  
○15歳未満の小児は使用しないでください。  
<用法・用量に関連する注意>  
(1) 定められた用法・用量をお守りください。  
(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ  
等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。  
(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。  
(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の弱い個所に、1〜2cm角の小片を目安  
として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめ  
てから使用してください。  
(5) 打撲(うちみ)、捻挫に使用するには、患部の熱感等の症状がおさまってから使  
用してください。  
(6) 本剤を使用してから汗をかくと刺激を感じる場合があります。  
(7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。  
(8) 本剤を貼った患部をこたつや電気毛布で温めないでください。  
(9) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がれ直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じるこ  
とがあるので、少なくとも入浴の1時間前に剥がし、入浴後30分ほどしてから使用してください。)

- **保管及び取扱い上の注意**  
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるかまたは開口  
部をおりまげて保管してください。  
(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html  
<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〈お問い合わせ先〉  
ラクール薬品販売株式会社  
フリーダイヤル 0120-86-8998

発売元  
**ラクール薬品販売株式会社**  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元  
**東光薬品工業株式会社**  
東京都足立区新田2丁目16番23号

1冊を挿入  
開かなくてもOK。

