●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

経皮吸収型鎮痛消炎パップ剤

インペタン

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないでください
   (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
   (1)目の周囲、粘膜等。　(2)湿疹、かぶれ、傷口。
   (3)みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
   (1)医師の治療を受けている人。
   (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
   (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

成分・分量　膏体100g中
インドメタシン……0.375g
添加物としてゼラチン、尿素、グリセリン、D-ソルビトール、エデト酸Na水和物、ℓ-メントール、カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、カルボキシビニルポリマー、クロタミトン、ケイ酸アルミン酸Mg、ラウリン酸マクロゴールを含有します。

効能・効果
腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘等）、筋肉痛、打撲、捻挫、肩こりによる肩の痛み

用法・用量　1日2回を限度として患部に貼付してください。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)本剤は11歳未満の小児には使用させないでください。
(3)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
(4)連続して2週間以上使用しないでください。
(5)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
(6)定められた用法・用量をお守りください。
(7)ご使用の際は、表面のポリプロピレンシートをはがして貼付してください。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル　0120-86-8998
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号
副作用被害救済制度　電話 0120-149-931

製造番号

使用期限

C