

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 エイクリヤー1%ゲル

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患
部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録 販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作 用の可能性があるので、直ちに使用を中止 し、この説明文書を持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場 合は使用を中止し、この説明文書を持って医 師、薬剤師または登録販売者に相談してくだ さい

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニ
ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 11歳以上の小児に使用さ
せる場合には保護者の指導監
督のもとに使用させてくだ
さい。(2) 11歳未満の小児には
使用させないでください。(3)
目に入らないよう注意してく
ださい。万一、目に入った場合
には、すぐに水またはぬるま
湯で洗ってください。なお、症
状が重い場合には、眼科医の
診療を受けてください。(4) 外
用にはのみ使用してください。
(5) 1週間当たり50gを超え
て使用しないでください。(6)
薬剤塗擦後の患部をラップ
フィルムなどの通気性の悪
いもので覆わないでくださ
い。(7) 定められた用法・用量
をお守りください。

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆

東光薬品工業株式会社 03-3855-0101

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931



4 944661 143415

インドメタシン 1%配合

肩・腰・筋肉の

痛み に 塗って効く

大容量
80g

やわらかく絞るだけで
ミネートチューブ



経皮吸収型消炎鎮痛剤

エイクリヤー 1%ゲル

第2類医薬品

【成分・分量】100g中

インドメタシン… 1,000mg
0-メントール… 3,000mg
添加物:ジインプロパノール
アミン、エドト酸Na水和物、
エタノール、ベンジルアル
コール、カルボキシビニル
ポリマー、チオ硫酸Na水和
物、ヒプロメロース、キサン
タンガム、1,3-ブチレングリ
コール、ハアセチルしょ糖、
N-メチル-2-ピロリドン

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密栓
して保管してください。(2) 小
児の手の届かない所に保管
してください。(3) 他の容器に
入れかえないでください。(誤
用の原因になったり品質が変
わることがあります)。(4) メ
ガネ、時計、アクセサリー等
の金属類、繊維の衣類、プラス
チック類、床や家具などの塗
装面等に付着すると変質す
ることがありますので、付着
しないよう注意してください。
(5) 火気に近づけないでくだ
さい。(6) 本剤のついた手で、
目などの粘膜にふれないで
ください。(7) 使用期限(外箱
及びチューブに記載)を過ぎ
た製品は使用しないでくだ
さい。

新潟 味 健
富田 池 藤