

⚠️【使用上の注意】

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- 3.5〜6日間使用しても症状がよくなるらない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

ここから
開けてください



●効能・効果●

しっしん、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守ってください
- (5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください

●成分・分量●100g中

ジフェンヒドラミン……………1.0g
グリチルレチン酸……………0.3g
ℓ-メントール……………5.0g
dl-カンフル……………1.0g
イソプロピルメチルフェノール……………0.1g
添加物:カルボキシビニルポリマー、グリセリン、N-メチル-2-ピロリドン、1,3-ブチレンジオール、ハアセチルしよ糖、エタノール、ジインプロパノールアミン、香料

*本品は、ステロイドを使用しておりません。

ピコ[®] クールゲル

かゆみ・虫さされに

炎症を
抑える
グリチルレチン酸

かゆみの元を
ブロック
ジフェンヒドラミン

セルフメディケーション
税 控除 対象

COOLな
塗り心地

炎症とかゆみにダブルの効果

本品は、ステロイドを使用しておりません

鎮痛消炎剤 20g 第3類医薬品

●保管及び取扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 火気に近づけないでください
- (5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

発売元

東光クリエート株式会社

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

お客様相談室 03-3855-0101

製造
番号

使用
期限

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931