

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛パップ剤

# ラクールC

第3類医薬品

## 特徴

ラクールCは有効成分(サリチル酸メチル、*dL*-カンフル、*l*-メントール等)による消炎鎮痛効果と、製剤中に含まれる多量の水による冷シブ作用により、患部の炎症・疼痛に優れた効果を発揮します。また、伸縮性不織布を使用していますので、関節部や筋肉の動きにぴったりフィットし、ヒジ、ヒザなどはがれやすい部位にも効果的です。



## 使用上の注意

**⊗してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しっしん、かぶれ、傷口。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、はれ、かゆみ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 効能・効果

打撲、捻挫、骨折痛、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛

## 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいている時は、よくふきとってからお貼りください。
- (4) 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

## 成分・分量 膏体100g中

| 成分              | 分量    |
|-----------------|-------|
| サリチル酸メチル        | 0.5g  |
| <i>dL</i> -カンフル | 0.5g  |
| <i>l</i> -メントール | 0.3g  |
| ジフェンヒドラミン       | 0.05g |

添加物として、ポリソルベート80、パラベン、デヒドロ酢酸Na、香料、中鎖脂肪酸トリグリセリド、酸化チタン、ヒプロメロース、リン酸水素Ca、グリセリン、D-ソルビトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、ポリアクリル酸Na、カルボキシビニルポリマーを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元

ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元

東光薬品工業株式会社  
東京都足立区新田2丁目16番23号

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

E

