

こちらから
開けてください

第2類医薬品

販売名 ラクスキットID1%ミルリイーゲル

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症
状を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等または化膿している患
部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録 販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作 用の可能性があるため、直ちに使用を中止 し、この説明文書を持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場 合は使用を中止し、この説明文書を持って医 師、薬剤師または登録販売者に相談してくだ さい

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



ミルリイーゲルは
黄白色でクリーム
のようになめらかな
感触の消炎鎮痛
ゲル剤です

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニ
ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
患部に塗擦してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 11歳以上の小児に使用さ
せる場合には、保護者の指導
監督のもとに使用させてくだ
さい。(2) 11歳未満の小児に
は使用させないでください。

(3) 目に入らないよう注意し
てください。万一、目に入った
場合には、すぐに水またはぬ
るま湯で洗ってください。な
お、症状が重い場合には、眼
科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してく
ださい。(5) 1週間当たり50g
を超えて使用しないでくださ
い。(6) 薬剤塗擦後の患部を
ラップフィルムなどの通気性
の悪いもので覆わないでく
ださい。(7) 定められた用法・
用量をお守りください。

発売元
東光クリエート株式会社
東京都東区立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都東区立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

インドメタシン1%配合

ラクスキットID1%

ミルリイーゲル

筋肉・関節の痛みをとる

経皮吸収型消炎鎮痛剤

大容量
80g

関節痛 腰痛 肩こりに伴う 肩の痛み 筋肉痛

【成分・分量】100g中
インドメタシン…1,000mg
0-メントール…3,000mg
添加物:インプロパノール、
マクロゴール、中鎖脂肪酸ト
リグリセリド、プロピレングリ
コール、ポリソルベート80、
ミリスチン酸イソプロピル、
ポリオキシエチレン硬化ヒマ
シ油、ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセチルエ
ーテル、カルボキシニルポリ
リマー、ヒプロメロース、チ
オ硫酸Na水和物、亜硫酸水
素Na、pH調節剤

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密栓
して保管してください。(2) 小
児の手の届かない所に保管
してください。(3) 他の容器
に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質
が変わることがあります)。(4)
メガネ、時計、アクセサリー等
の金属類、化繊の衣類、プラ
スチック類、床や家具などの
塗装面等に付着すると変質
することがありますので、付
着しないよう注意してくださ
い。(5) 本剤のついた手で、目
などの粘膜にふれないでく
ださい。(6) 使用期限(外箱及
びチューブに記載)を過ぎた
製品は使用しないでください。

製造
販売

第2類医薬品