

第3類医薬品

ご使用に際し、この説明文書(台紙)を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

製造番号

使用期限

RAKCOOL

ラキール  
ジェル

清涼感のある  
ポケットゲルタイプ 15g

1 かゆみ止め成分、抗炎症成分、殺菌成分を配合しています

2 ℓ-メントール配合でひんやりして爽快な塗りごころ

3 手を汚さずに塗れる直塗りチューブ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師または薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5~6日間使用しても症状がよくなるらない場合。

効能・効果

しっしん、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください (4) 定められた用法・用量を守ってください

成分・分量

100g中

ジフェンヒドラミン……………1.0g   グリチルレチン酸……………0.3g  
 ℓ-メントール……………5.0g   dℓ-カンフル……………1.0g  
 イソプロピルメチルフェノール……………0.1g  
 添加物:カルボキシビニルポリマー、グリセリン、N-メチル-2-ピロリドン、1,3-ブチレングリコール、ハアセチルしょ糖、エタノール、ジイソプロパノールアミン、香料

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください(2) 小児の手の届かない所に保管してください(3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 火気に近づけないでください(5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

発売元 ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元 東光薬品工業株式会社  
東京都足立区新田2丁目16番23号



お問い合わせ先 0120-86-8998

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931 又は 03-3506-9411

A 4 987435 560315



いんかん

ミシン目によって開けてください