

ご使用に際し、この説明文書をお読みください。また、必要なときに随機によく読むように大切に保管してください。

使用上の注意

2. 使用中または使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用中を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

② けいせい ③ むくも

④ せき

⑤ せき

⑥ せき

⑦ せき

⑧ せき

⑨ せき

⑩ せき

⑪ せき

⑫ せき

⑬ せき

⑭ せき

⑮ せき

⑯ せき

⑰ せき

⑱ せき

㉑ せき

㉒ せき

㉓ せき

㉔ せき

㉕ せき

㉖ せき

㉗ せき

㉘ せき

㉙ せき

㉚ せき

㉛ せき

㉜ せき

㉝ せき

㉞ せき

㉟ せき

㊱ せき

㊲ せき

㊳ せき

㊴ せき

㊵ せき

㊶ せき

㊷ せき

㊸ せき

㊹ せき

㊺ せき

㊻ せき

㊼ せき

㊽ せき

㊾ せき

㊿ せき

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000



この説明文書をお読みください

24時間効果持続

肩、腰、筋肉の痛みは... 3分カット! ... 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用中を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

7枚入 1枚 10cm x 14cm 保通ワスナー付

RAKOOL 第2類医薬品 ラクペタソDX テープ

RAKOOL 第2類医薬品 7枚入 1枚 10cm x 14cm 保通ワスナー付

Main advertisement illustration with text: 大判サイズ 全方向伸縮タイプ ニット素材 肩、腰、筋肉の痛みは...

ラクール 経皮鎮痛消炎剤 ラクペタソDX テープ

RAKOOL シタロフェナクNa1%

RAKOOL 第2類医薬品 ラクペタソDX テープ

RAKOOL 第2類医薬品 7枚入 1枚 10cm x 14cm 保通ワスナー付

RAKOOL 第2類医薬品 7枚入 1枚 10cm x 14cm 保通ワスナー付

RAKOOL 第2類医薬品 7枚入 1枚 10cm x 14cm 保通ワスナー付