

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△【使用上の注意】【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【成分・分量】100g中／ジフェンヒドラミン…1.0g
グリチルレチン酸…0.3g
イソプロピルメチルフェノール…0.1g
dl-カンフル…1.0g β-メントール…5.0g
添加物：ベン酸、カルボキシビニルポリマー、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシド、パラベン、エドト酸Na水和物、ジソプロパノールアミン

発売元
ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
0120-86-8998

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度
0120-149-931

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります。)4.使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってラクビオンSを口に入れてしまった場合

・口の周りや口の中についたクリームをできるだけふき取ってください。・少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気があらわれることがあります。・しばらく様子を見て、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診療を受けてください。



かゆみ・かぶれ・虫さされ 20g



ノンステロイドクリーム剤 第3類医薬品

製造
番号

使用
期限

【効能・効果】湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3箇月以上です。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)定められた用法・用量を守ってください。

ラクビオンS 20g

第3類医薬品

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【成分・分量】100g中 / ジフェンヒドラミン…1.0g
グリチルレチン酸…0.3g
イソプロピルメチルフェノール…0.1g
dl-カンフル…1.0g / β -メントール…5.0g
添加物：ペン酸、カルボキシビニルポリマー、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、エタノ酸Na水和物、ジソプロパノールアミン

発売元
ラケール薬品販売株式会社
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

お問い合わせ先
0120-86-8998
副作用被害救済制度
0120-149-931

開封口

△【使用上の注意】【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)4.使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってラクビオンSを口に入れてしまった場合

・口の周りや口の中についたクリームをできるだけふき取ってください。・少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気があることがあります。・しばらく様子を見て、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診療を受けてください。



A



日本調剤
オンラインストア

日本調剤企業
5COINS
PHARMA

セルフメディケーション
税 控 除 税 優 待

子どもにも使いやすい
虫さされ
かゆみに

ノンステロイド

β -メントール配合

クリーム



20g

第3類医薬品

製造
番号
使用
期限

【効能・効果】 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3箇月以上です。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)定められた用法・用量を守ってください。