

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠️【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (3) 潤滑やただれのひどい人。

発売元 製造販売元
ラクール薬品販売株式会社 東光薬品工業株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号 東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ◆
 フリーダイヤル 0120-86-8998

副作用被害救済制度
 電話 0120-149-931

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください
 <用法・用量に関連する注意>(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後1箇月以上です。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)定められた用法・用量を守ってください。

成分・分量 100g中

ジフェンヒドラミン…1.0g、グリチルリチン酸…0.5g、
 イソプロピルメチルフェノール…1.5g、
 トコフェロール酢酸エステル…0.5g、アラントイン…0.2g
 添加物:1,3-ブチレングリコール、グリセリン、トリソオクタン酸グリセリン、ベニルアルコール、ステアリン酸、ペン酸、ミスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、タルク、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジメチルポリシロキサン、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物

お子様に優しい!

アルコール・メントール無配合
 ノンステロイドクリーム剤



無香料・無着色

かゆみ、虫さされ あせも

第3類医薬品 25g

やわらかく絞り出しやすい **ラミネートチューブ**

RAKCOOL

ラクピオンベビー



保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
4. 使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってラクピオンベビーを口に入れてしまった場合

○口の周りや口の中についたクリームをできるだけふき取ってください。○少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気やあらわれることがあります。○しばらく様子を見て、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診察を受けてください。

製造
番号

使用
期限