

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かゆみ・湿疹・虫さされに
キンカン[®]スティック

第3類医薬品

外用鎮痒消炎剤

【特徴】

キンカンスティックは、手を汚さずに広く塗ることができる、スーッとした使用感のぬり薬です。かゆみ止めのジフェンヒドラミン、抗炎症成分のグリチルレチン酸が患部にとどまり、湿疹・かゆみに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹・皮ふ炎・ただれ・あせも・かぶれ・かゆみ・しもやけ・虫さされ・じんましん

【用法・用量】


1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用してください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

【使用方法】

- (1)患部を清潔な状態（汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態）にしてください。
- (2)キャップを開けて図のように容器下部のダイヤルをまわし、薬剤を3～4mm出してご使用ください。
薬剤を出し過ぎると折れの原因になりますのでご注意ください。
- (3)使用後は、薬剤を容器に戻し、キャップを閉めてください。



【成分・分量】 100g中

成分	含量
ジフェンヒドラミン	1.0g
グリチルレチン酸	0.3g
dl-カンフル	7.0g
l-メントール	5.0g

添加物として、ステアリン酸Na、エタノール、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、アンモニア水含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
4. 火気に近づけないでください。
5. メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面に付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
6. 使用期限（箱及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
7. 本剤は揮発性が強いので、開封後は外気にふれないように保管してください。ご使用後は必ずキャップをしっかり閉めてください。

【消費者相談窓口】

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL：03-3421-6171（代表）

受付時間：9：00～16：00 月～金（祝日を除く）

発売元 株式会社金冠堂
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

製造販売元 東光薬品工業株式会社
〒123-0865 東京都足立区新田2丁目16番23号