

【成分・分量】100g中

インドメタシン…1,000mg
 〇-メントール……6,000mg
 トコフェロール酢酸エステル
 ……2,000mg

添加物:BHT、エタノール、
 1,3-ブチレングリコール、ポ
 リオキシエチレンセチルエ
 ーテル、ポリオキシエチレン
 ポリオキシプロピレンセチル
 エーテル、カルボキシビニル
 ポリマー、ヒプロメロース、
 ジイソプロパノールアミン、
 チオ硫酸Na水和物、エドト
 酸Na水和物

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿
 気の少ない涼しい所に密
 栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所
 に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえない
 てください。(誤用の原因
 になったり品質が変わる
 ことがあります)
- (4) メガネ、時計、アクセサリ
 等の金属類、化繊の衣
 類、プラスチック類、床や
 家具などの塗装面等に
 付着すると変質すること
 がありますので、付着し
 ないように注意してくださ
 い。
- (5) 火気に近づけないでくだ
 さい。
- (6) 本剤のついた手で、目な
 どの粘膜にふれないでく
 ださい。
- (7) 使用期限(外箱及びチュー
 ブに記載)を過ぎた製品
 は使用しないでください。

matsu
kiyo

Topical
Anti-inflammatory
Analgesic

ラクールIDゲルEX

インドメタシンが
浸透して効く

ゲル

肩・腰・ひざなどの

痛み

EX

成分

・インドメタシン
:1,000mg

痛みの元に浸透し、
痛みを抑えます

・〇-メントール
:6,000mg

清涼感を与え、
痛みを和らげます

・トコフェロール
酢酸エステル
:2,000mg

末梢の血行を促進
し、肩こり痛などを
和らげます

100g中

第2類医薬品

こんな方におすすめ

- 辛い痛みをすぐに
取りたい方
- 広範囲に塗りたい方

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
 み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・
 手首の痛み)、肘の痛み(テニ
 ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
 患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳以上の小児に使用
 させる場合には保護者の
 指導監督のもとに使用さ
 せてください。
- (2) 11歳未満の小児には使
 用させないでください。
- (3) 目に入らないよう注意し
 てください。万一、目に
 入った場合には、すぐに
 水またはぬるま湯で洗っ
 てください。なお、症状
 が重い場合には、眼科医
 の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してくだ
 さい。
- (5) 1週間当たり50gを超え
 て使用しないでください。
- (6) 薬剤塗擦後の患部をラッ
 プフィルムなどの通気性
 の悪いもので覆わないで
 ください。
- (7) 定められた用法・用量を
 お守りください。

発売元
 東光クリエート株式会社
 製造販売元
 東光薬品工業株式会社
 東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
 お客様相談窓口 03-3855-0101
 受付時間 9:00~17:00
 (土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

ここから
開けてください



第2類
医薬品

ラクールIDゲルEX

ラミネートチューブ

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
 が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー
 症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録
 販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こした
 ことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
 用の可能性があるので、直ちに使用を中止
 し、この文書を持って医師、薬剤師または登
 録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりな
 い場合は使用を中止し、この文書を持って医師、
 薬剤師または登録販売者に相談してくださ
 い

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニー
 のオリジナル商品です。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931