

◀ cut ----- 手で簡単に切れます。 ----- cut ▶



外用鎮痛消炎薬

第2類医薬品

ロキソプロフェンNa 5%^{配合}

痛みの芯に浸透!

トクホニ
Loxy

テープ

(7cm×10cm)

失敗しても
貼りなおせる

発売元
大正製薬株式会社¹¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元
同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2

大正製薬(株)お客様119番室
☎ 03-3985-1800
🕒 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

◀ cut ----- 手で簡単に切れます。 ----- cut ▶

使用前に、この袋の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

トクホンLoxyテープ

第2類医薬品

▲ 使用上の注意

■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください
(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 高齢者。(5) 次の診断を受けた人。気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢・軟便
4. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性あります)

効 能

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回患部に貼ってください。

[注意] (1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成 分

成 分	分 量	はたらき	
膏体 100g中	ロキソプロフェン ナトリウム水和物	5.67g (無水物 として5g)	痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成をおさえ、痛みをやわらげます。
	l-メントール	1.6g	清涼感をあたえ、痛みをやわらげます。
	トコフェロール酢酸エステル	2.3g	患部の血行を促進します。

添加物: スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ジブチルヒドロキシルエン、流動パラフィン、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 開封後は未使用分はもとの袋に入れ、袋の開口部をきちんと折り曲げて保管してください。(品質保持のため) (4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931