

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かゆみ 虫され カナコα

第②類医薬品

■鎮痒消炎剤 ■販売名：カナコα

「刺されてすぐ」に起こるかゆみは、蚊に刺された場合では、まず蚊が血を吸う時に出す唾液により体内の細胞からヒスタミンという物質が分泌され、この物質が神経細胞を刺激することによるもので、ジフェンヒドラミン塩酸塩はこのヒスタミンの働きをおさえます。しばらくしてからもぶり返す「しつこいかゆみ」は、炎症がもとになるもので、デキサメタゾン酢酸エステルはこの炎症をおさえます。また、メントール、カンフルも皮膚に清涼感を与えるとともに、かゆみを鎮め、殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールはかき傷等からの二次感染を防ぎます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白斑、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

※塗布部を肌に数回押し当て、ラバーに薬液を充分しみこませてから使用してください。

<用法及び用量に関する注意>

- (1) ステロイド成分を含んでおりますので、同じ部位に継続して使用する場合は、顔面には2週間以内、その他の部位でも4週間以内を目安にしてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6ヵ月以上です。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分とそのはたらき】

成分 (100mL中)	分 量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	かゆみ、はれのもととなる炎症をおさえるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1,000mg	かゆみをおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	100mg	殺菌作用があります。
dl - カンフル	1,000mg	おだやかな局所冷感刺激作用でかゆみをおさえます。
I - メントール	3,500mg	

添加物としてジブチルヒドロキシトルエン、グリセリン、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉め、立て保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (5) 容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所には長時間放置しないでください。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や液もれが起こるおそれがありますので保管に注意してください。
- (6) 液がたれないように注意して使用してください。
- (7) 金属類、化繊の衣類、プラスチック類、皮製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 火気には近づけないでください。
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記まで
お願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668

受付時間 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地