

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

鎮痛消炎剤

かいつうせんLX

第2類医薬品

<製品の特長>

すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を配合。痛みの元に直接浸透し、つらい痛みを和らげます。また、ユーカリ油（香料）配合により、心地よい清涼感を持続させます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。
 - （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
 - （3）15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
 - （1）目の周囲、粘膜等
 - （2）皮膚の弱い部位（顔、わきの下等）
 - （3）湿疹、かぶれ、傷口
 - （4）みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。
（本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （3）妊婦又は妊娠していると思われる人
 - （4）高齢者
 - （5）次の診断を受けた人：気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。（他の疾患の可能性もあります）

【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日3～4回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、塗布部を肌に数回押し当て、スポンジ面に液を浸透させてから使用してください。
- (5) 1回あたり約2g（塗布面積：手のひらで約8枚分）、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中

成 分	分 量
ロキソプロフェンナトリウム水和物	1.13g（無水物として1g）

添加物：エタノール、プロピレングリコール、ヒプロメロース、l-メントール、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ユーカリ油

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 金属類、化学繊維、プラスチック類、皮革、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封した後は、なるべく早く使用してください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記まで
お願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668

受付時間 10:00～16:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地