

(成分・分量) 1.0m²中
サリチル酸メチル...9.0g ノニル酸(ニトリルアミン)...0.018 dl-カーフル...1.8g ハラ油...1.2g ハラ油...1.2g
トコフェロール...0.5g
添加物として、ボリデン、生ゴム(ポリイソブレン、エスチルゴム、天然ゴム)、アクリル酸メチル、アクリル酸、イソブチル共重合樹脂、ポリオキシエチレンジノルフィニルヨウテル、天然コムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

気孔付

はりぐすり 新ザルスH

第3類医薬品

ここから開けてください



気孔付



外用鎮痛消炎剤 第3類医薬品

新ザルスH

販売元

キヨーリンメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地

気孔付

使用期限

製造番号

はりぐすり

HFA

セルフメディケーション
税控除対象

製造販売元
大協薬品工業株式会社

富山市水橋町第173

お客様相談窓口 電話: 076-479-1313
受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

4 987154013406

T21

外用鎮痛消炎剤
販売名: 新ザルスH

品目番号 追加R4-74-652

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

[用法・用量]

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

[用法・用量に関する注意]

(1)用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 貼った患部をコップや電気毛布等で温めないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取つてから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自用として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に繋げて貼らないでください。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります。)。(4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



74mm×52mm 22枚入