

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。
使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

インドメタシン1.0%配合 鎮痛消炎剤

タミトール®ID液

第2類医薬品

外用鎮痛消炎剤

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 11歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (2) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の傷み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法及び用量

1日4回を限度として適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連するご注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 11歳未満の小児に使用させないで下さい。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。
- (6) 1週間あたり50mLを超えて使用しないで下さい。
- (7) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。
- (8) 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて塗布しないで下さい。
- (9) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けて下さい。
- (10) 使用後は手を洗って下さい。

成分及び分量

100mL中

成分	分量	はたらき
インドメタシン	1000mg	鎮痛作用・消炎作用が患部にはたらき、痛みやはれを鎮めます。
l-メントール	3000mg	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、マクロゴール、ベンジルアルコール、エタノールを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかり閉めて涼しい所（冷暗所）に立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 火の中に投じないで下さい。
- (6) 本剤のついた手で目等の粘膜に触れないで下さい。
- (7) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意して下さい。
- (8) 本剤が衣服や寝具等に付着し、汚れた場合はなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問合せ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元　ゼネル薬品工業株式会社　大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元　東和製薬株式会社　和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

インドメタシン1.0%配合 鎮痛消炎剤

タミトール[®]ID液

第2類医薬品

外用鎮痛消炎剤

■特長

- タミトールID液は、痛みやはれのもとに直接作用するインドメタシンを1.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎剤です。
- 主成分のインドメタシンが、塗った所から直接患部に働き、肩・腰・関節のつらい痛みにも優れた効果を発揮します。
- l*-メントール配合により、塗布後心地よい清涼感があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守って下さい。
- (2)1歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)11歳未満の小児に使用させないで下さい。
- (4)目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (5)外用にのみ使用して下さい。
- (6)1週間あたり50mLを超えて使用しないで下さい。
- (7)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。
- (8)皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて塗布しないで下さい。
- (9)同じ部位に他の外用剤との併用は避けて下さい。
- (10)使用後は手を洗って下さい。

【成分・分量】(100mL中)

成分	分量	はたらき
インドメタシン	1000mg	鎮痛作用・消炎作用が患部にはたらき、痛みやはれを鎮めます。
ε-メントール	3000mg	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、マクロゴール、ベンジルアルコール、エタノールを含有する

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないで下さい。
- (5)火の中に投じないで下さい。
- (6)本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないで下さい。
- (7)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意して下さい。
- (8)本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落として下さい。
- (9)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

—ご相談窓口—

お買い求めのお店又は
下記窓口まで
ゼネラル薬品工業株式会社
☎(06)6352-2381
時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

発売元 **ゼネラル薬品工業株式会社**
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **東和製薬株式会社**
和歌山県紀の川市貴志川町丸瀬1229番地