

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

### 第3類医薬品

鎮痛消炎パップ剤

# コリアフターパップF

40枚入(8枚入×5袋) [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量10g]

#### 【特長】

- 炎症効果のある成分(ℓ-メントール、サリチル酸グリコール、アルニカチンキ)と血行促進成分(トコフェロール酢酸エステル)により、痛みとこりを改善します。
- 微香性で薄型の冷感パップ剤です。
- 伸縮性がよく、肌にぴったりフィットします。

#### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1)目の周囲、粘膜等。
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### 【用法・用量】

- 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。
- (1)定められた用法・用量を守って下さい。
  - (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
  - (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。

#### 【成分・分量】 (膏体100g中)

成 分	分 量	は たら き
ℓ-メントール	0.5g	炎症を抑えます
サリチル酸グリコール	1.0g	痛みをやわらげます
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	末梢の血行をよくします
アルニカチンキ	1.0mL (原生薬として) 0.2g	腫れや炎症をやわらげます

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈ご相談窓口〉

お問い合わせのお店又は下記窓口まで  
東和製薬株式会社 ☎(0736)64-2567  
時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

使用期限

製造番号

