

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

肩こり・腰痛・筋肉痛

サンコリス冷感

鎮痛消炎パップ剤

30枚入

10cm×14cm

特 長

- 微香性で、鎮痛作用と消炎作用のあるパップ剤です。
- 伸縮性がよく、肌にピッタリとフィットします。
- 肘や膝などの関節に貼っても、はがれにくい。

△ 使用上の注意

してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。

1. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止
し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談して下さい。

効 能 ・ 効 果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、
しもやけ、骨折痛

用 法 ・ 用 量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して
下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ
て下さい。
- (3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

成分・分量 膏体100g (1000cm²) 中

成 分	分 量	は た ら き
ℓ-メントール	0.5g	炎症を抑えます
dℓ-カンフル	0.5g	
サリチル酸グリコール	1.5g	痛みをやわらげます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行をよくします

添加物:ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。
使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈ご相談窓口〉

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社
☎ (0736) 64-2567
時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元: **東和製薬株式会社**
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

使用期限

製造番号

