



開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 15才未満の小児
- 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)
  - (3) 湿疹、かぶれ、傷口
  - (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
- 長期連用しないでください。

#### ⊗ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の医薬品の投与を受けている人  
ニューキノロン系抗菌剤
- 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(フケ、アカ)のような皮膚のはがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・たれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすしてください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

### 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性  
エタノール含有物

外用鎮痛消炎薬  
販売名: サンツールDF液α

第2類医薬品 内容量  
100mL

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

お問い合わせ先  
株式会社 富士薬品(学術室)  
☎048-648-1118  
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元: 東和製薬株式会社  
と歌山県紀の川市吉志町町丸九橋1229番地  
発売元: 株式会社 富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目393番地

# 痛みを鎮める サンツール® DF液α

## 腱鞘炎・肩の痛み 腰痛・関節痛

# ジクロフェナク ナトリウム塩

清涼感 l-メントール

## 鎮痛力



セルフメディケーション  
税 控除 対象

[液剤] 100mL  
外用鎮痛消炎薬  
第2類医薬品

### 効能・効果

関節痛、肩こりに伴う痛み、腱鞘炎(手・手の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

### 用法・用量

1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

#### (用法・用量)に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 1週間あたり50mlを超えて使用しないでください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水はめるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (6) 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて塗布しないでください。

※塗布部を肌当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

#### 成分・分量 <100g中>

ジクロフェナクナトリウム 1.0g  
l-メントール 3.0g

添加物: ジブチルヒドロキシステレン、アジピン酸ジイソプロピル、ベンジルアルコール、マクロゴール、クエン酸水和物、エタノール 含有

