

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

鎮痛消炎パップ剤 うちみ・ねんざ・肩こり・筋肉痛

新エスターパップ®

痛み、はれをおさえるパップ剤で伸縮性が高く、関節に使用してもはがれにくい特長があります。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を守って下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

成分・分量 (膏体100g中：1000cm²)

ℓ-メントール……………1.0g dℓ-カンフル……………0.5g
 サリチル酸グリコール……………1.0g トコフェロール酢酸エステル……………0.3g
 アルニカチンキ……………1.0mL (原生薬0.2g相当)

添加物：セラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。
配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- 配置期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



8枚入 [12cm×8.5cm]

配置期限

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号

お客様ご相談窓口

(株)富士薬品(OTC学術室)
 ☎(048)648-1118
 受付 9:00～17:30
 (土・日・祝日を除く)



(01)14987524903716(93)2004

製造販売元 **東和製薬株式会社**
 和歌山県紀の川市真志川町丸栢1229番地

