

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。**第3類医薬品**
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛・消炎貼付剤 温感パップ

新サリートス温パップF

24枚入(8枚入×3袋) [1枚あたり(10cm×14cm)]

【特長】

- サリチル酸グリコールとℓ-メントールが炎症を抑え、トコフェロール酢酸エステルとトウガラシエキスの働きで患部の血行を促進し、日々の痛みやコリをやわらげます。
- 薄型で伸縮性がよく、肌にぴったりフィットします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者監督のもとに使用させて下さい。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、拭きとってから使用して下さい。
- (5)打撲、捻挫には、はれがひいてから使用して下さい。
- (6)入浴の1時間前には、はがして下さい。また入浴後は30分位してから使用して下さい。
- (7)薬剤にふれた手指はよく洗って下さい。

【成分・分量】膏体100g中

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	1.4g	痛みをやわらげます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行をよくします
ℓ-メントール	0.3g	炎症を抑えます
トウガラシエキス	0.075g [日局トウガラシ3.75g相当量]	局所の血管を拡張、 血行をよくします

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、赤色106号、その他2成分含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。
- (5)使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

使用期限

製造番号



4 540943 278303

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸樋1229番地

〈ご相談窓口〉

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社
☎(0736)-64-2567
時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



01

ここを押して
開けて下さい。