

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

12枚入
(14cm×10cm)

御嶽山百草湿布薬

第3類医薬品
鎮痛消炎パップ剤

●特長

- 古くから打撲・ねんざ等に用いられてきたオウバクに、炎症や痛みを抑えるアルニカチンキを配合しました。
- 粘着性に優れ、伸縮性のある基布を使用していますので、肌にピッタリとフィットします。
- 夏期の温度上昇時でも、ダシ、ベタツキがなく、はがした後も膏体が皮膚に残りません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないで下さい。

- 1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口



🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

●効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

- 本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることもありますが、品質・効果に変化はありません。
- 薬剤が衣服や寝具に付着すると、黄色に着色することがありますのでご注意ください。

●用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付して下さい。
必要に応じて包帯、テープ等でとめて下さい。

- 1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。
- 4) 皮膚の弱い人は同じ部位へ連続して使用しないで下さい。

●成分・分量 膏体100g(1000cm²)中

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|---------------|-----------------------|-------------|
| オウバク末 | 2.0g | |
| アルニカチンキ | 1.0ml (原生薬0.2g相当量) | 炎症を抑える生薬です |
| l-メントール | 0.5g | 炎症を抑えます |
| dl-カンフル | 0.4g | |
| サリチル酸グリコール | 1.0g | 痛みをやわらげます |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 0.05g | かゆみの発生を抑えます |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.3g | 末梢の血行をよくします |

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、モノステアリン酸ソルビタン、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

●保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 4) 未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

発 売 元  日野製薬株式会社
長野県木曾郡木祖村大字数原1598
TEL 0264-36-3311

製造販売元 東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸瀬 1229番地

〈ご相談窓口〉

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社
☎ (0736)64-2567
時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



使用期限

製造番号



02

ここを押して
開けて下さい。