

第2類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

ムシイチ(外用鎮痒消炎薬)

ムシイチは、抗ヒスタミン剤のジフェンヒドラミン、抗炎症剤のグリチルレチン酸、局所麻酔剤のジブカイン塩酸塩を配合した鎮痒消炎薬で、かゆみ、かぶれ、皮膚炎などに効果をあらわします。また配合成分のl-メントール、dl-カンフルが患部に清涼感を与え、塗った後のベタつきも少なくさわやかな感じを与えるかゆみ止めの軟膏です。

特長

- かゆみや炎症をしずめるジフェンヒドラミン配合
- 炎症をしずめるグリチルレチン酸、かゆみをしずめるジブカイン塩酸塩を配合
- ベタつかず、さわやかな塗り心地

**使用上の注意****相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

虫さされ、かゆみ、じんま疹、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、しもやけ、ただれ

用法・用量

1日1回～数回、適量を患部に塗布またはすりこんで使用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 皮膚が敏感な人は、腕の裏側などの柔らかいところに少量つけて、異常がないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 本品100g中

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1,000mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をしずめます。
l-メントール	2,000mg	清涼感を与えて、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	3,000mg	
グリチルレチン酸	200mg	炎症をしずめます。
ジブカイン塩酸塩	100mg	局所麻酔作用により、かゆみをしずめます。

添加物：ステアリン酸、プロピレングリコール、ステアリルアルコール、水酸化K、ペン酸、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビットツウ、トリエタノールアミン、パラベン

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

0120-149-931

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社

神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元

三重県伊賀市白檜字永谷2604-5