

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎プラスター 〈温感〉

# トクホンエースホット

トクホンエースホット

第3類医薬品

## ⚠【使用上の注意】

### ■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

#### 1. 次の部位には使用しないこと

- 1) 目の周囲、粘膜など
- 2) 湿疹、かぶれ、傷口

### ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 【用法及び用量】

薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13才未満の人への使用はさけてください。
2. 患部を清潔にしてから使用してください。
3. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
5. 入浴の1時間前にははがしてください。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
6. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないでください。

## 【成分及び分量】 有効成分 膏体 100g (0.455m<sup>2</sup>) 中

成分	分量
l-メントール	1.0g
サリチル酸グリコール	2.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.013g
ビタミンE酢酸エステル	0.8g

添加物として酸化チタン、ジブチルヒドロキシトルエン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、二酸化ケイ素、ポリイソブチレン、マクロゴール、流動パラフィン、エステルガム、その他1成分を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後は、袋の開封口を折り曲げて保管し、早めに使用してください。
4. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

発売元 <sup>31</sup>  
**大正製薬株式会社**  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元  
**株式会社 トクホ**  
東京都豊島区高田3丁目26番3号

——本文は、直接外箱に記載されている事項です——



大正製薬

20枚入  
(7cm×10cm)

しっかり効いて肌にやさしい

トクホンエース ホット

Tokuhon Ace hot

においが  
気にならない


肩こり  
腰痛  
筋肉痛

◎目立たない  
ファンデーションカラー

◎血行を促進する  
ビタミンE配合

◎四スミが丸くはがれにくい

h 温感



外用鎮痛消炎プラスタ―

第3類医薬品

第3類医薬品

温感

しっかり効いて肌にやさしい  
トクホンエース ホット

h

ご使用に際してこの説明書を必ず  
お読みください。また、必要なときに  
読めるよう大切に保管してください。

押しあける

TOKUHON

外用鎮痛消炎プラスタ― トクホンエース ホット  
貼り薬 Tokuhon Ace hot

温感  
第3類医薬品

特長

- SIS基剤の採用により、サリチル酸グリコールが速やかに患部に浸透し、つらい痛みにすぐれた効果を発揮します。
- ノニル酸ワニリルアミドの温かな刺激とビタミンEの作用で血行が改善され、頑固なコリをほぐします。
- ソフトな基剤と伸縮性の基布の採用で、関節部でもピッタリと密着します。
- 微香性で目立たないファンデーションカラーです。



使用上の注意

- してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
  - 1. 次の部位には使用しないこと
    - 1) 目の周囲、粘膜など 2) 湿疹、かぶれ、傷口
  - 相談すること
    - 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
      - ・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
    - 2. 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
    - 3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

- 薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付してください。
1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13才未満の人への使用はさけてください。
  2. 患部を清潔にしてから使用してください。
  3. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
  4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
  5. 入浴の1時間前にははがしてください。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
  6. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないでください。

成分及び分量

有効成分 膏体100g(0.455m<sup>2</sup>)中

成分	分量
l-メントール	1.0g
サリチル酸グリコール	2.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.013g
ビタミンE酢酸エステル	0.8g

添加物として酸化チタン、ジブチルヒドロキシトルエン、スチレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体、二酸化ケイ素、ポリイソブチレン、マクロゴール、流動パラフィン、エステルガム、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 開封後は袋の開封口を折り曲げて保管し、早めに使用してください。
4. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

- 内容量：20枚入(10枚入×2袋)
- 販売名：トクホンエースホット

大正製薬(株) お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元  
大正製薬株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
http://www.taisho.co.jp  
製造販売元  
株式会社 トクホン  
東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

