

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

トクホンチール AX

TOKUHON CHILL-AX

外用鎮痛消炎液剤 / 塗り薬

特 長

- 血行をよくするノニル酸ワニリルアミドを配合しました。
- 速やかに皮膚から吸収されたサリチル酸誘導体が、すぐれた鎮痛消炎作用を発揮します。
- 肌にやさしい抗炎症作用のあるグリチルレチン酸を配合しました。
- 塗布面がヨコ向きですから毛生部や関節部のほか、肩や首筋等にも楽にご使用いただけます。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1.次の部位には使用しないこと

- 1)目の周囲、粘膜など 2)湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】



1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に

相談すること

- ・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13歳未満の人への使用はさけてください。
2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
4. 入浴の1時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じことがあります。
5. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
6. 使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
7. 塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触ると、変色することがありますので注意してください。
8. 強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹼でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。


【成分及び分量】有効成分 100mL中

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	3.5g	
サリチル酸メチル	3.5g	炎症を抑え痛みをやわらげる
l-メントール	6.0g	
dl-カンフル	2.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげる
ノニル酸ワニリルアミド	15mg	血行をよくする
グリチルレチン酸	0.1g	皮膚の炎症を抑える

添加物としてアルコール、ハーセチルショ糖、水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光を避け、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないよう注意してください。
5. 使用期限（容器底面・小箱底面に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
6. 火気に近づけないでください。



【内容量】 82mL 販売名：チールAX

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号

製造販売元
株式会社トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)