

つらい肩の痛み、腰痛に深く浸透効いていく!

フェイタスシップ® 温感

フェルビナク配合シップ剤

商品の特長

- 優れた抗炎症・鎮痛効果のある「フェルビナク」を1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎シップ剤です。
- 「フェルビナク」は痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、腰・肩・関節・筋肉の痛みにより優れた効きめを発揮します。
- トウガラシエキスの心地よい温感刺激で血行をよくし、肩の痛み、腰痛、関節痛などによく効きます。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- 左右に引っばるだけでフィルムがはがせる「バリピタシート®採用」なので、どんな部位でも簡単に貼る事ができます。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ®」です。



⚠️ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、痛み、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

【用法・用量】 1日2回を限度として、患部に貼ってください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (5) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (6) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (7) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (8) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
フェルビナク	0.7g
トウガラシエキス	0.1g(原生薬換算1.25g)

添加物として、エデト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、*l*-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。
- (5) 開封後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包装》10cm × 14cm …………… 10枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

フェイタスシップ® 温感

フェルピナク配合シップ剤 (販売名)

16 枚入 第2類医薬品
サイズ:10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)
保温チャック付



△ 使用上の注意

×してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 患部の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、痛み、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとは別)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (5) 強い刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分待ってから使用してください。
- (6) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (7) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (8) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
フェルピナク 0.7g トウガラシエキス 0.1g(原生薬換算1.25g)
添加物として、エト酸Na、N-メチル-2-ヒロロドン、L-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタクリ酸アルミレンMg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手が届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎0120-149-931



1B413T

16 枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

フェイタスシップ® 温感

フェルピナク配合シップ剤

第2類医薬品



第2類医薬品
微香性



温感 痛みが 関節・筋肉 直接浸透

大判サイズ 10cm×14cm

16 枚入

hisamitsu®



第2類医薬品

16 枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

フェイタスシップ® 温感
第2類医薬品

16 枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

16 枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

フェイタスシップ® 温感

フェルピナク配合シップ剤

第2類医薬品