

スポーツ時の
筋肉疲労などに
第3類医薬品
スプレー式鎮痛消炎剤 微香性
販売名: **エア-グロバス・ジェット**
ご使用に際して、この説明書を必ずお読
みください。また、必要に応じてすぐ
めに大切に保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・
薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
製造販売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥取市田代大宮町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>
お客様相談室: TEL.0120-133250
受付時間/9:00-17:00(土日・祝日・全国休日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

△【使用上の注意】

×してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副
作用が起こりやすくなります。] 1. 次の
部位には使用しないでください。(1)目
の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者にご相談ください。薬など
によりアレルギー症状を起こしたこと
がある人。2. 使用后、次の症状があら
われた場合は副作用の可能性がありま

すので、直ちに使用を中止し、この説明
書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくな

らない場合は使用を中止し、この説明
書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者にご相談ください。【効能・効果】
筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、
ねんざ、関節痛、しもやけ【用法・用量】
1日数回、適量を患部に噴霧してくだ
さい。〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用してくだ
さい。(2)目に入らないように注意し
てください。万一、目に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯で洗って
ください。なお、症状が重い場合には眼
科医の診療を受けてください。(3)顔

に向けて噴霧しないでください。(4)大
量・広範囲には使用しないでください。
(5)外用にのみ使用し、吸入しないで
ください。吸入によりめまい、吐き気等の
症状を起こすことがありますので、でき
るだけ吸入しないよう、また周囲の人
にも十分注意して使用してください。

(6)患部まで10cmの距離で噴霧して
ください。(7)同じ箇所に連続して1秒
以上噴霧しないでください(凍傷にな
るおそれがあります)。**【成分・分量】**成
分含量(原液100mL中) ①-L-メントー
ール...10.0g、サリチル酸グリコール...
2.0g、グリチルチン酸...0.2g 添加

物として、ヒドロキシプロピルセルロー
ス、1,3-ブチレングリコール、無水エタ
ノール、DMEを含有します。【保管及び
取扱い上の注意】(1)直射日光の当たら
ない湿気の少ない涼しい所に保管して
ください。(2)小児の手の届かない所に
保管してください。(3)他の容器に入れ

替えないでください(誤用の原因になっ
たり、品質が変わることがあります)。(4)本剤
が衣類や家具、皮革製品、化粧品等に付着し
ないように注意してください。変質又は変色
するおそれがあります。(5)火気に近づけな
いでください。(6)火花が出る所で使用しな
いください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

スプレー式鎮痛消炎剤

第3類医薬品

エアースロンパス[®]ジェット^α 微香性

- サリチル酸グリコールによる鎮痛消炎効果と優れた冷却効果のスプレー剤です。
- 患部にスプレーすると、炎症を抑え、痛みを鎮め、筋肉痛、筋肉疲労などに優れた効果を発揮します。
- 微香性なので周囲の人に気を使わずに使用できます。

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、ねんざ、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴霧してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用

さしてください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3)顔に向けて噴霧しないでください。(4)大量・広範囲には使用しないでください。(5)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(6)患部まで10cmの距離で噴霧してください。(7)同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないでください(凍傷になるおそれがあります)。

成分・分量

成分含量(原液100mL中)

ℓ-メントール...10.0g、サリチル酸グリコール...2.0g、グリチルレチン酸...0.2g 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレングリコール、無水エタノール、DMEを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)本剤が衣類や家具、皮革製品、化成品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。(5)火気に近づけないでください。(6)火花が出る所で使用しないでください。

廃棄の際のガス抜きの注意事項と方法


〈ガス抜きの注意事項〉

- ・必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。
- ・ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
- ・本品のキャップ以外は使用しないでください。
- ・噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。

〈ガス抜きの方法〉

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

①押しボタンを引き抜きます。



②キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。



③キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。



④噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250

受付時間 / 9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度  0120-149-931



6123HD

Hisamitsu®



当社従来品に
比べて
缶のアルミ
使用量を
減らしました。

Salonpas®
エア-サロンパス® ジェットα

筋肉痛・筋肉疲労時の筋肉ケアに

微香性

第3類医薬品

使用前に次の説明文を必ずお読みください。販売名: エア-®サロンパス®ジェットα セルフメディケーション

第3類医薬品 税 控除 対象

お客様アンケート・
商品情報はこちらへ▶



製造販売元

久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間 / 9:00-17:50

(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

●暖房器具(ファンヒーターなど)の周囲や直射日光の当たる車の中などは温度が上がり破裂するおそれがあり危険です。
●缶の錆を防ぐために水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
●捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

火気厳禁 サリチル酸グリコール
1,3-ブチレンジグリコール 無水エタノール
水溶性
第二石油類
105mL
危険等級Ⅲ

●キャップには、点字でエアロ
スプレーと表示してあります。

●製造番号、使用期限は
缶底に記載 8424HD

使用上の注意

×してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この缶を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この缶を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

[効能・効果] 筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、ねんざ、関節痛、しもやけ
[用法・用量] 1日数回、適量を患部に噴霧してください。

[用法・用量に関する注意] (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3) 顔に向けて噴霧しないでください。(4) 大量・広範囲には使用しないでください。(5) 外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(6) 患部まで10cmの距離で噴霧してください。(7) 同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないでください(凍傷になるおそれがあります)。

[成分・分量] 成分含量(原液100mL中) ℓ-メントール…10.0g、サリチル酸グリコール…2.0g、グリチルレチン酸…0.2g 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレンジグリコール、無水エタノール、DMEを含有します。

[保管及び取り扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 本剤が衣類や家具、皮革製品、化粧品等に付着しないように注意してください。変質又は変色するおそれがあります。(5) 火気に近づけないでください。(6) 火花が出る所で使用しないでください。

ガス抜きの注意事項と方法

①必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。②本品のキャップ以外使用しないでください。③ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。④噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。
<ガス抜きの方法>①スプレーボタンを取り外します。②缶を逆さにしてキャップ中央の穴にノズルを押し込みます。(右図)③噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により分別廃棄してください。



携帯に便利

Hisamitsu®

AIR® SPORTS時の 筋肉ケアに! SALONPAS®

すぐ使える
キャップレス
スプレー
採用!



販売名:
エアースポーツ
【有効成分】
...2.0g、
ローソ、1.3g
【注意】
かぶれ、
又は登録
ください

火気厳禁
注意

製造販売元
〒841-0011
お電話
受付時間

FOR MUSCLE PAIN AND FATIGUE AFTER SPORTS,
THE SPRAY HAS ANTI-INFLAMMATORY PAIN
RELIEVING EFFECT AND EXCELLENT COOLING
EFFECT!

第3類医薬品

第3類医薬品

詳しい情報は
こちらへ▼



ご使用に際して、この説明書を必ずお読み
ください。また、必要なときにすぐ読める
ように大切に保管してください。

スプレー式鎮痛消炎剤
エア[®]サロンパス[®]ジェットα

微香性

第3類
医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります。

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。薬などにより
アレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性がありますので、直ちに
使用を中止し、この説明書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる
ない場合は使用を中止し、この説明書を持
って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。

効能・効果

筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、ねんざ、
関節痛、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴霧してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)小児に使用させ
る場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ
てください。(2)目に入らないように注意してくだ
さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬ
るま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合に
は眼科医の診療を受けてください。(3)顔に向けて
噴霧しないでください。(4)大量・広範囲には使用
しないでください。(5)外用にのみ使用し、吸入し
ないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症
状を起こすことがありますので、できるだけ吸入し
ないよう、また周囲の人にも十分注意して使用し
てください。(6)患部まで10cmの距離で噴霧して
ください。(7)同じ箇所に連続して1秒以上噴霧し
ないでください(凍傷になるおそれがあります)。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求め
の薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」まで
お願い申し上げます。

製造販売元

久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
<https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250

受付時間／9:00-17:50

(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

成分・分量

成分含量(原液100mL中)

ℓ-メントール…10.0g、サリチル酸グリコール
…2.0g、グリチルレチン酸…0.2g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、
1,3-ブチレングリコール、無水エタノール、DME
を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に保管してください。(2)小児の手の届かない所に
保管してください。(3)他の容器に入れ替えないで
ください(誤用の原因になったり、品質が変わるこ
とがあります)。(4)本剤が衣類や家具、皮革製品、
化粧品等に付着しないように注意してください。変
質又は変色するおそれがあります。(5)火気に近づ
けないでください。(6)火花が出る所で使用しない
でください。(7)この説明書をよく読み、保管して
おいてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であ
り、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用
しないこと。
- ③高温にすると破裂の
危険があるため、直射日光の当たる所
や火気等の近くなど温度が40度以上
となる所に置かないこと。
- ④火の中
に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

●暖房器具(ファンヒーターなど)の周囲や直射日光
の当たる車の中などは温度が上がり破裂するおそ
れがあり危険です。●缶の錆を防ぐために水回りや
湿気の多い場所に置かないでください。●捨てる
ときには火気のない屋外で噴射音が消えるまでボ
タンを押し、ガスを抜いてください。●カバンなど
に入れて持ち運ぶ際は、他の荷物に押されて噴射
ボタンが作動しないように十分に注意してください。

火気厳禁

第二石油類 8.75mL

危険等級Ⅲ

無水エタノール

サリチル酸グリコール

1,3-ブチレングリコール

水溶性

3123HD