

藥袋包裝!!



10枚入
サイズ:7cm×10cm

フェイス®

フェルビナク配合テープ剤 5.0



当社従来品に比べて
パッケージ(外箱)を省き
紙の使用量を減らしました。

肩などの
痛みに
直接浸透!

セルフメディケーション

税控除对象

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>



4 987188 124406

切り口 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

切り口 → → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

一、⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人には使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。2. 次^①の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘^②膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし、たし^③等又は化膿している患部。3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、 ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

效能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法·用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

経皮鎮痛消炎テープ剤
販売名：フェイタス®5.0

第2類医薬品

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
(2) 定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するためではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
(4)汗をかいたり皮膚がぬれたる時は、よくふき取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目立たせて半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量（膏体100g中）

フェルピナク	5.0g
ℓ-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g
(*ビタミンE誘導体)	

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光や高温を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手が届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり、品質が変わることがあります)。(4)開封後はチェックをしっかり閉めて保管してください。(5)使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

お客様アンケート・
商品情報は
こちらへ ▶



2E190T



印字範圍

41 × 25 mm